



PATRONES CLÍNICOS DE LOS FUMADORES QUE ACUDEN A UNA CONSULTA DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA: UN ANÁLISIS CUALITATIVO Y DE MINERÍA DE TEXTOS

Rábade Castedo, Carlos; Zamarrón Sanz, Carlos; Abelleira Paris, Romina; Hermida Ameijeiras, Álvaro; Toubes Navarro, María Elena; Ricoy Gabaldón, Jorge; Rodríguez Núñez, Nuria; Lama López, Adriana; Valdés Cuadrado, Luis

EOXI Santiago de Compostela

INTRODUCCIÓN: El análisis del relato de la experiencia con el tabaco, del sujeto fumador que desea hacer un intento de abandono, puede proporcionarnos una información más amplia sobre las características de éste pudiendo así realizar una intervención terapéutica más eficaz.

OBJETIVOS: Extracción, mediante metodología cualitativa y minería de textos, de los patrones característicos del fumador.

MATERIAL Y MÉTODOS: 60 sujetos atendidos de forma consecutiva en las consultas externas de Neumología del Hospital Clínico Universitario por tabaquismo. Se realiza una entrevista clínica semiestructurada que incluye el relato del paciente sobre su experiencia del tabaquismo. Se codifica de forma abierta cada frase del fumador y tras ésta se elabora una teoría fundamentada. Posteriormente se realiza un análisis del discurso mediante minería de textos (establece relaciones entre las palabras, las frases, frecuencia de las mismas, creando clústers).

RESULTADOS: Los fumadores de la consulta de Tabaquismo presentan una alta dependencia y niveles de ansiedad. El síntoma más frecuente es la disnea. Se identifican de forma nítida 3 perfiles clínicos en el análisis de clústers: a) Uno relacionado con la adicción a la nicotina (fumadores con alta dependencia) b) otro con la percepción del daño que ocasiona el tabaco y con el miedo a no ser capaz de dejar de fumar (fumadores con baja autoeficacia) c) el consumo de tabaco es desencadenado por estímulos externos. (Figura 1, 2 y 3).


CONCLUSIONES: La identificación de cada uno de los patrones clínicos en el sujeto fumador, podría permitir un manejo más dirigido de las terapias de estos pacientes.

Análisis cualitativo: Codificación de los discursos del fumador



Los fumadores de la consulta de Tabaquismo se caracterizan por presentar una alta dependencia a la nicotina , baja autoeficacia , ansiedad , siendo la disnea el síntoma más frecuente referido

Análisis multifactorial de las concurrencias. Clústers de pacientes



Análisis multifactorial de las concurrencias. Clústers de pacientes

